ALGIROIDE NANO

Famiglia: Lacertidi
Genere: *Algyroides*
Specie: *Algyroides fitzingeri, Wiegmannn 1834*
Nome comune: Algiroide nano o di Fitzinger
Nome sardo: *Caliscettedda, Fattaredda*

Algiroide nano

IDENTIFICAZIONE
Endemismo sardo-corso, si distingue dalle altre lucertole perché più piccola (10-13 cm), con le squame del dorso carenate e appuntite e per l'assenza delle strie sopracciliari. Il corpo è piccolo, la coda è invece molto lunga (7-8 cm). La testa piccola ha il muso arrotondato. La colorazione del corpo è marrone scuro, quasi nero superiormente; possono avere sfumature arancioni sul ventre e verde giallastro sui fianchi e sotto il mento. I maschi si distinguono dalle femmine per la coda più grossa.

ALIMENTAZIONE
Si nutre di insetti e di ragni.

COMPORTAMENTO
Animale attivo durante il giorno, prevalentemente nella prima metà della giornata. A differenza delle altre lucertole è più lento e meno agile. Ha un periodo di letargo molto lungo, che va da settembre sino ad aprile, per il fatto che è molto sensibile alle variazioni di temperatura.

RIPRODUZIONE
Dopo gli accoppiamenti, tra maggio e giugno, la femmina depone le uova (da 1 a 4). Dopo un incubazione di circa 70 giorni, verso agosto settembre nascono i piccoli.

HABITAT
Predilige le zone ombreggiate tra la vegetazione e nelle aree rocciose dal livello del mare sino a 1500 m. Non frequenta i coltivi.

STATUS
Specie che potrebbe rischiare l'estinzione a causa degli incendi, quindi per la riduzione degli habitat.

AREALE DI DISTRIBUZIONE
Distribuito in tutta la Sardegna comprese le isolette, ad eccezione del Campidano.